



Faglig kontakt under eksamen:
Johan Aarnes 73 59 17 44

EKSAMEN I FAG TMA4135 MATEMATIKK 4D

Bokmål

Fredag 19. desember 2003

Tid: 0900–1400

Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator (HP 30S)
Rottmann: *Matematisk formelsamling*

Sensurdato: 19. januar 2004

Alle svar skal begrunnes, og det skal være med så mye mellomregning at fremgangsmåten fremgår tydelig av besvarelsen.

Oppgave 1

a) Vis at den Laplacetransformerte av $f(t) = 2te^t - e^t + e^{-t}$ er gitt ved

$$F(s) = \frac{4}{(s-1)^2(s+1)}.$$

Finn videre invers Laplacetransformert av $e^{-s}F(s)$.

b) Bruk Laplacetransformasjonen til å løse initialverdiproblemet

$$y'' - y = r(t) \quad \text{for } t > 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1,$$

hvor $r(t) = 0$ for $0 < t < 1$ og $r(t) = e^t$ for $t > 1$.

Oppgave 2 Løs integralligningen

$$y(t) = 1 - \int_0^t (t - \tau)y(\tau) d\tau, \quad t > 0.$$

Oppgave 3

- a) La $f(x) = x(1 - x)$ for $0 \leq x \leq 1$. Finn Fourier-sinusrekken til $f(x)$.
- b) Bestem summen av rekken $1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} - + \dots$

I resten av oppgaven skal vi se på rand- og initialverdiproblemet

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} + g = 0, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad (1)$$

der g er en gitt konstant. (Problemet modellerer en svingende, horisontal streng påvirket av tyngdekraften.)

- c) Finn funksjonen $v(x)$ (uavhengig av tiden t) som tilfredsstillers randproblemet

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{xx} + g = 0, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ v(0, t) = v(1, t) = 0, & t \geq 0, \end{cases} \quad (2)$$

- d) Finn alle løsninger på formen $w(x, t) = F(x)G(t)$ av randproblemet

$$\begin{cases} w_{tt} - w_{xx} = 0, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ w(0, t) = w(1, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (3)$$

Bestem videre en løsning av (3), gitt på rekkeform, slik at $u(x, t) = v(x) + w(x, t)$ løser det opprinnelige problemet (1).

Oppgave 4

Vi ser på den partielle differensialligningen

$$u_t - 2tu_{xx} = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

med randbetingelsene $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u(x, t) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} u_x(x, t) = 0$ for $t \geq 0$.

- a) Finn en ordinær differensialligning tilfredsstillt av den Fouriertransformerte $\hat{u}(w, t) = \mathcal{F}\{u(x, t)\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t)e^{-iwx} dx$ av $u(x, t)$, og løs denne ligningen.
- b) Anta i tillegg initialbetingelsen

$$u(x, 0) = f(x), \quad -\infty < x < \infty,$$

der f er en gitt kontinuerlig, integrerbar funksjon. Vis at $u(x, t)$ kan skrives på formen

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x - y)g(y, t) dy, \quad (t > 0)$$

og finn $g(y, t)$ eksplisitt. Det oppgis at $\mathcal{F}\{e^{-ax^2}\} = \frac{1}{\sqrt{2a}}e^{-w^2/4a}$ ($a > 0$ konstant).

Oppgave 5

- a) Bruk både Lagranges og Newtons interpolasjonsmetoder til å finne annengradspolynomet $p(x)$ som oppfyller $p(-1) = 1$, $p(0) = 1$ og $p(1) = 3$. Merk at begge metodene skal vises.
- b) Anta at $f(x)$ er en tre ganger kontinuerlig deriverbar funksjon slik at

$$f(-1) = 1, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = 3 \quad \text{og} \quad |f'''(x)| \leq 1 \quad \text{for} \quad -1 < x < 1.$$

Vis at $|f(x) - p(x)| \leq \frac{1}{9\sqrt{3}}$ for $-1 \leq x \leq 1$. (*Hint:* Ta utgangspunkt i en av formlene fra det vedlagte formelarket.)

Oppgave 6 Utfør én iterasjon med Newtons metode på ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 - x_2^3 + 1 &= 0, \\ x_1^2 - x_1x_2 - 1 &= 0, \end{aligned}$$

med startverdier $x_1^{(0)} = 1$, $x_2^{(0)} = 1$.

Oppgave 7 Vi skal løse numerisk

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 4x(1 - x), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

La $N \geq 2$ være et heltall, sett $h = 1/N$, og la $k > 0$. Dette gir oss gitterpunktene (x_i, t_j) , der $x_i = i \cdot h$, $t_j = j \cdot k$. Vi betrakter differanseskjemaet (fullt implisitt metode)

$$\frac{U_i^{j+1} - U_i^j}{k} = \frac{U_{i+1}^{j+1} - 2U_i^{j+1} + U_{i-1}^{j+1}}{h^2} \quad \text{for} \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \quad j = 0, 1, \dots,$$

der U_i^j er den søkte tilnærmelsen til u i punktet (x_i, t_j) .

- a) La $N = 4$, $k = \frac{1}{32}$. Vis at ligningssystemet for U_1^1 , U_2^1 og U_3^1 kan skrives

$$\begin{cases} 2U_1^1 - \frac{1}{2}U_2^1 &= \frac{3}{4}, \\ -\frac{1}{2}U_1^1 + 2U_2^1 - \frac{1}{2}U_3^1 &= 1, \\ -\frac{1}{2}U_2^1 + 2U_3^1 &= \frac{3}{4}, \end{cases} \quad (*)$$

- b) Sett $x = U_1^1$, $y = U_2^1$ og $z = U_3^1$, og utfør én iterasjon med Gauss-Seidels metode på (*), med startverdier $x^0 = 3/4$, $y^0 = 1$ og $z^0 = 3/4$.