

**1** Oppgaven kan, for eksempel, løses ved hjelp av Lagrange-interpolasjon eller Newtons interpolasjonsformel.

- *Lagrange-interpolasjon:*

$$\begin{aligned}
 p(x) &= 3,0 \frac{x(x-1)(x-2)}{-1(-1-1)(-1-2)} + 0,5 \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{1(-1)(-2)} \\
 &\quad - 1,0 \frac{(x+1)x(x-2)}{(1+1)1(1-2)} - 1,5 \frac{(x+1)x(x-1)}{(2+1)2(2-1)} \\
 &= -\frac{1}{2}(x^3 - 3x^2 + 2x) + \frac{1}{4}(x^3 - 2x^2 - x + 2) \\
 &\quad + \frac{1}{2}(x^3 - 3x^2 - 2x) - \frac{1}{4}(x^3 - x) \\
 &= 0,5x^2 - 2,0x + 0,5
 \end{aligned}$$

- *Newtons interpolasjonsformel:* Tabellen over dividerte differenser er gitt ved

$x_i$	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, \dots, x_{i+3}]$
-1,0	3,0	-2,5		
0,0	0,5	-1,5	0,5	
1,0	-1,0		0,5	0,0
2,0	-1,5	-0,5		

så interpolasjonspolynomet blir

$$\begin{aligned}
 p(x) &= 3,0 - 2,5(x+1,0) + 0,5(x+1,0)x + 0,0(x+1,0)x(x-1,0) \\
 &= 0,5x^2 - 2,0x + 0,5.
 \end{aligned}$$

**2** Vi kan skrive initialverdiproblemet på formen

$$y'' + 4y = 2 \sin 2t [1 - u(t - \pi)], \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0. \quad (*)$$

La så  $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ . Legg merke til at  $\sin 2t = \sin 2(t - \pi)$ . Laplace-transformerer så (\*). Det gir

$$s^2 Y + 4Y = \frac{4}{s^2 + 4} (1 - e^{-\pi s}),$$

det vil si

$$Y = \frac{4}{(s^2 + 4)^2} (1 - e^{-\pi s}).$$

Ettersom

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4}{(s^2 + 4)^2} \right\} = \sin 2t * \sin 2t = \frac{1}{4} (\sin 2t - 2t \cos 2t),$$

gir andre forskynningsteorem at

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \frac{1}{4}(\sin 2t - 2t \cos 2t) - \frac{1}{4}(\sin 2(t-\pi) - 2(t-\pi) \cos 2(t-\pi))u(t-\pi) \\ &= \frac{1}{4}(\sin 2t - 2t \cos 2t) - \frac{1}{4}(\sin 2t - 2(t-\pi) \cos 2t)u(t-\pi) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4}(\sin 2t - 2t \cos 2t) & \text{for } 0 \leq t < \pi, \\ -\frac{\pi}{2} \cos 2t & \text{for } t > \pi. \end{cases} \end{aligned}$$

**3** Den retningsderiverte til  $f(x, y)$  i punktet  $(1, 1)$  langs vektoren  $\mathbf{a}$  kan uttrykkes som

$$D_{\mathbf{a}}f(1, 1) = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} \bullet \nabla f(1, 1).$$

Med andre ord, vil  $D_{\mathbf{e}}f(1, 1) = 0$  for de enhetsvektorene  $\mathbf{e}$  som står ortogonalt på  $\nabla f(1, 1)$ .

Gradienten til  $f(x, y) = \ln(x^2 + e^{2xy})$  er gitt ved

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} = \frac{2}{x^2 + e^{2xy}} ((x + ye^{2xy})\mathbf{i} + xe^{2xy}\mathbf{j}),$$


slik at

$$\nabla f(1, 1) = \frac{2}{1 + e^2} ((1 + e^2)\mathbf{i} + e^2\mathbf{j}).$$

Altså er

$$\mathbf{e} = \frac{\pm 1}{\sqrt{1 + 2e^2 + 2e^4}} (-e^2\mathbf{i} + (1 + e^2)\mathbf{j}).$$

**4** a) Grafen til den  $2\pi$ -periodiske utvidelsen til  $f(x)$  er gitt ved figuren under.



Den komplekse Fourier-rekken til  $f(x)$  er gitt ved

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx},$$

der

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-x} e^{-inx} dx = \frac{1}{2\pi} \left[ -\frac{1}{1+in} e^{-(1+in)x} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{1}{2\pi} \left( -\frac{1}{1+in} e^{-\pi} e^{-in\pi} + \frac{1}{1+in} e^{\pi} e^{in\pi} \right) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{1+in} (-1)^n (e^{\pi} - e^{-\pi}) \\ &= \frac{\sinh \pi}{\pi} \frac{(-1)^n (1-in)}{1+n^2}. \end{aligned}$$

Altså er den komplekse Fourier-rekken til  $f(x)$  gitt ved

$$f(x) \sim \frac{\sinh \pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - in)}{1 + n^2} e^{inx}.$$

b) Ettersom  $f(x)$  er kontinuerlig i  $x = 0$  får vi at

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 = \frac{\sinh \pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - in)}{1 + n^2} \\ &= \frac{\sinh \pi}{\pi} \left( \dots - \frac{1+3i}{1+3^2} + \frac{1+2i}{1+2^2} - \frac{1+i}{1+1^2} + 1 - \frac{1-i}{1+1^2} + \frac{1-2i}{1+2^2} - \frac{1-3i}{1+3^2} + \dots \right) \\ &= \frac{2 \sinh \pi}{\pi} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2}, \end{aligned}$$

slik at

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2 \sinh \pi}.$$

Ettersom  $f(x)$  har et sprang i  $x = \pi$  får vi at

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} [f(\pi^+) + f(\pi^-)] &= \cosh \pi = \frac{\sinh \pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - in)}{1 + n^2} e^{in\pi} \\ &= \frac{\sinh \pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - in)}{1 + n^2} (-1)^n \\ &= \frac{\sinh \pi}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1 - in}{1 + n^2} \\ &= \frac{2 \sinh \pi}{\pi} \left( 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} \right), \end{aligned}$$

slik at

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi \cosh \pi}{2 \sinh \pi} - 1 = \frac{\pi}{2 \tanh \pi} - 1.$$

**5** Integralligningen kan skrives på formen

$$f(x) - (f * g)(x) = e^{-|x|}, \quad g(x) = e^{-4|x|}. \quad (*)$$

La så  $\hat{f}(w) = \mathcal{F}(f)$ . Fourier-transformerer så (\*). Det gir

$$\hat{f}(w) - \sqrt{2\pi} \hat{f}(w) \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{4}{w^2 + 16} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w^2 + 1},$$

det vil si

$$\left( 1 - \frac{8}{w^2 + 16} \right) \hat{f}(w) = \frac{w^2 + 8}{w^2 + 16} \hat{f}(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w^2 + 1}.$$

Altså har vi at

$$\hat{f}(w) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{w^2 + 16}{(w^2 + 1)(w^2 + 8)}.$$

Delbrøkoppspalting gir så

$$\begin{aligned} \frac{w^2 + 16}{(w^2 + 1)(w^2 + 8)} &= \frac{1}{w^2 + 1} + \frac{8}{(w^2 + 1)(w^2 + 8)} = \frac{1}{w^2 + 1} + \frac{8}{7} \left( \frac{1}{w^2 + 1} - \frac{1}{w^2 + 8} \right) \\ &= \frac{1}{7} \left( \frac{15}{w^2 + 1} - \frac{8}{w^2 + 8} \right). \end{aligned}$$

Finner så  $f(x)$  ved å ta inverstransformasjonen, det vil si

$$f(x) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{f}) = \frac{1}{7} \left( 15e^{-|x|} - \frac{8}{2\sqrt{2}} e^{-2\sqrt{2}|x|} \right) = \frac{1}{7} (15e^{-|x|} - 2\sqrt{2}e^{-2\sqrt{2}|x|}).$$

- 6** a) Setter inn  $u(x, t) = F(x)G(t)$  i  $u_t = u_{xx} + 2u$ . Det gir

$$F(x)\dot{G}(t) = F''(x)G(t) + 2F(x)G(t) \quad \text{det vil si} \quad F''(x)G(t) = F(x)(\dot{G}(t) - 2G(t)),$$

slik at

$$\underbrace{\frac{F''(x)}{F(x)}}_k = \underbrace{\frac{\dot{G}(t) - 2G(t)}{G(t)}}_k.$$

Dette gir følgende to 2. ordens ordinære differensiellligninger

$$F''(x) - kF(x) = 0, \quad (1)$$

$$\dot{G}(t) - (k+2)G(t) = 0. \quad (2)$$

Løser så (1), gitt randbetingelsene  $u_x(0, t) = 0$  og  $u_x(\pi, t) = 0$ , det vil si  $F'(0) = 0$  og  $F'(\pi) = 0$ . Med andre ord,

$$F''(x) - kF(x) = 0, \quad F'(0) = 0, \quad F'(\pi) = 0. \quad (1')$$

Vi har tre muligheter for  $k$ :

- (i)  $k = p^2 > 0$ : Innsatt for  $k = p^2$  i (1') får vi

$$F''(x) - p^2 F(x) = 0.$$

Denne ligningen har løsning

$$F(x) = Ae^{px} + Be^{-px}.$$

Ettersom

$$F'(x) = p(Ae^{px} - Be^{-px}),$$

gir  $F'(0) = 0$  at  $A = B$ . Fra  $F'(\pi) = 0$  får vi

$$F'(\pi) = Ap(e^{p\pi} - e^{-p\pi}) = 2Ap \sinh p\pi = 0.$$

Altså må  $A = 0$ . Dermed står vi kun igjen med den trivuelle løsningen  $u(x, t) = 0$ .  
Altså er  $k \leq 0$ .

- (ii)  $k = 0$ : Innsatt for  $k = 0$  i (1') får vi

$$F''(x) = 0,$$

som har løsning  $F(x) = Ax + B$ . Fra  $F'(0) = 0$  og  $F'(\pi) = 0$  får vi  $A = 0$ . Altså står vi igjen med løsningen  $F(x) = \text{konstant}$ .

- (iii)  $k = -p^2 < 0$ : Innsatt for  $k = -p^2$  i (1') får vi

$$F''(x) + p^2 F(x) = 0,$$

som har løsning

$$F(x) = A \cos px + B \sin px.$$

Ettersom

$$F'(x) = p(B \cos px - A \sin px),$$

får vi at  $F'(0) = Bp = 0$ , det vil si  $B = 0$ . Altså har vi at  $F(x) = A \cos px$ . Fra  $F'(\pi) = 0$ , får vi

$$F'(\pi) = -pA \sin p\pi = 0.$$

Ettersom  $A = 0$  kun gir den trivelle løsningen  $u(x, t) = 0$ , ser vi på tilfellet der  $\sin p\pi = 0$ . Det gir  $p = n = 1, 2, 3, \dots$ . Altså er  $k = -n^2$ .

Ved å kombinere (ii) og (iii) har vi funnet at alle mulige løsninger for (1'), gitt våre randbetingelser, er på formen

$$F_n(x) = \tilde{A}_n \cos nx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Setter så inn for  $k = -n^2$  i (2). Det gir

$$\dot{G}(t) + (n^2 - 2)G(t) = 0 \quad \text{det vil si} \quad \dot{G}(t) = (2 - n^2)G(t),$$

som har løsning

$$G_n(t) = C_n e^{(2-n^2)t}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Altså er alle løsninger på formen  $u(x, t) = F(x)G(t)$ , som tilfredstiller  $u_t = u_{xx} + 2u$  og de gitte randbetingelsene, gitt ved

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n(x)G_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{(2-n^2)t} \cos nx.$$

b) Legg merke til at  $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ , slik at

$$u(x, 0) = (\cos x + 1)^2 = \cos^2 x + 2 \cos x + 1 = \frac{3}{2} + 2 \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x.$$

De løsningene vi fant i oppgave a) som i tillegg tilfredstiller initialbetingelsen gitt over, er da gitt ved

$$u(x, t) = \frac{3}{2}e^{2t} + 2e^t \cos x + \frac{1}{2}e^{-2t} \cos 2x.$$

**7** La  $y_1 = y$  og  $y_2 = y'$ . Da blir ligningssystemet

$$\begin{aligned} y'_1 &= y_2, & y_1(0) &= \frac{\pi}{2}, \\ y'_2 &= \sin y_1, & y_2(0) &= 0. \end{aligned}$$

Et skritt med trapesmetoden på denne ligningen er gitt ved

$$\begin{aligned} y_{1,n+1} &= y_{1,n} + \frac{h}{2}(y_{2,n} + y_{2,n+1}), \\ y_{2,n+1} &= y_{2,n} + \frac{h}{2}(\sin y_{1,n} + \sin y_{1,n+1}). \end{aligned}$$

Med  $h = 0,1$ ,  $n = 0$  og  $y_{1,0} = \frac{\pi}{2}$ ,  $y_{2,0} = 0$  blir dette

$$\begin{aligned} y_{1,1} &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{20}y_{2,1} & 20y_{1,1} - y_{2,1} - 10\pi &= 0 \\ y_{2,1} &= \frac{1}{20}(1 + \sin y_{1,1}) & \sin y_{1,1} - 20y_{2,1} + 1 &= 0. \end{aligned}$$

**8** Her er

$$J(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 20 & -1 \\ \cos(x_1) & -20 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 20x_1 - x_2 - 10\pi \\ \sin(x_1) - 20x_2 + 1 \end{bmatrix}.$$

Med oppgitte startverdier blir  $J(\mathbf{x}^{(0)})\Delta\mathbf{x} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(0)})$  til

$$\begin{bmatrix} 20 & -1 \\ 0 & -20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

med løsning  $\Delta x_2 = \frac{1}{10} = 0,1$  og  $\Delta x_1 = \frac{1}{200} = 0,0005$ . Dermed blir

$$x_1^{(1)} = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{200} \approx 1,5758, \quad x_2^{(1)} = 0,1000.$$

**9** Differanseskjemaet blir for  $U_{i,j} \approx u(x_i, t_j)$

$$\frac{U_{i,j+1} - U_{ij}}{k} = \kappa \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2} + x_i(1 - x_i)$$

eller

$$U_{i,j+1} = U_{i,j} + \kappa \frac{k}{h^2} (U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}) + kx_i(1 - x_i),$$

for  $i = 1, 2, \dots, N-1$ , og  $j = 0, 1, 2, \dots$ , og med

$$U_{i,0} = \sin \pi x_i = \sin i\pi h, \quad U_{0,j} = U_{N,j} = 0.$$

Med  $\kappa = 0,1$ ,  $h = 0,25$  og  $k = 0,2$  blir dette ( $x_i = 0,25i$ )

$$U_{i,j+1} = U_{i,j} + 0,32(U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}) + 0,05i(1 - 0,25i).$$

Med startverdiene

$$U_{0,0} = 0, \quad U_{1,0} = \sin \frac{\pi}{4} \approx 0,70711, \quad U_{2,0} = \sin \frac{\pi}{2} = 1,$$

$$U_{3,0} = \sin \frac{3\pi}{4} \approx 0,70711, \quad U_{4,0} = \sin \pi = 0$$

ender vi med

$$u(0,25, 0,2) \approx U_{1,1} \approx 0,6121,$$

$$u(0,50, 0,2) \approx U_{2,1} \approx 0,8625,$$

$$u(0,75, 0,2) \approx U_{3,1} \approx 0,6121.$$