

# Løsningsforslag Eksamens i SIF 5506 Statistikk 1/6 1999

## Oppgave 1)

Mulige hendelser ved årsskiftet:

$E$  = Tap av elektrisitetsforsyningen,  $P(E) = 0.05$

$V$  = Tap av forsyning av vann,

$F$  = Tap av fjernvarme,  $P(F) = 0.05$

Får også oppgitt at  $P(E \cap F) = 0.02$

a)

$R$  = Romtemperaturen går ned = Tap av el.forsyningen eller tap av fjernvarme. Dette er det samme som:

$$R = E \cup F$$

Sannsynligheten for  $R$  blir:

$$\begin{aligned} P(R) &= P(E) + P(F) - P(E \cap F) \\ &= 0.05 + 0.05 - 0.02 = \underline{\underline{0.08}} \end{aligned}$$

$P(E) \cdot P(F) = 0.0025 \neq P(E \cap F) \Rightarrow \underline{\underline{\text{E og F er avhengige.}}}$

$P(E \cap F) \neq 0 \Rightarrow E \cap F \neq \emptyset \Rightarrow \underline{\underline{\text{E og F er ikke disjunkte.}}}$

b)

I oppgave får vi oppgitt at  $P(V|(E \cup F)^c) = 0.07$  og at  $P(V|E \cup F) = 0.5$ . Dette kan vi bruke til å finne følgende sannsynligheter:

$$P(V|(E \cup F)^c) = \frac{P(V \cap (E \cup F)^c)}{P((E \cup F)^c)} = 0.07$$

$$\Rightarrow P(V \cap (E \cup F)^c) = P((E \cup F)^c) \cdot 0.07 = (1 - P(E \cup F)) \cdot 0.07 = 0.92 \cdot 0.07 = \underline{\underline{0.064}}$$

$$P(V|E \cup F) = \frac{P(V \cap (E \cup F))}{P(E \cup F)} = 0.5 \Rightarrow P(V \cap (E \cup F)) = P(E \cup F) \cdot 0.5 = 0.08 \cdot 0.05 = \underline{\underline{0.04}}$$

Vi kan dermed finne  $P(V)$  som blir:

$$P(V) = P(V \cap (E \cup F)) + P(V \cap (E \cup F)^c) = 0.04 + 0.064 = \underline{\underline{0.104}}$$

Sannsynligheten for at laboratotieforsøk blir avbrutt er:

$$P(E \cup F \cup V) = P(R \cup V) = P(R) + P(V \cap R^c) = 0.08 + 0.064 = \underline{\underline{0.144}}$$

## Oppgave 2)

Antar antall grove fartsoverskridelser,  $X$ , over et tidsrom  $t$  er Poissonfordelt med parameter  $\lambda t$ .

a)

Sannsynlighetsfordelingen til  $X$  er gitt ved:

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}$$

Med  $\lambda = 0.5$  og  $t = 5$  får vi :

$$P(X = x) = \frac{(2.5)^x e^{-2.5}}{x!}$$

Sannsynligheten for at det skjer ingen grove overskridelser i perioden:

$$P(X = 0) = e^{-2.5} = \underline{\underline{0.082}}$$

Sannsynligheten for at det skjer mer enn 2 grove overskridelser i perioden:

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) \\ &= 1 - (0.082 + 0.205 + 0.257) = \underline{\underline{0.456}} \end{aligned}$$

$$\text{E}[X] = 2.5, \text{ Var}[X] = 2.5$$

b)

Sann fart på bilene er  $\mu$ , lasermålingene er  $N(\mu, 1.5^2)$ . Skal finne sannsynligheten for at laseren viser mer enn 130 km/h for en bil som kjører i 129 km/h.

$$\begin{aligned} P(Y > 130 \mid \mu = 129) &= P\left(\frac{Y - 129}{1.5} > \frac{130 - 129}{1.5}\right) \\ &= P(Z > 0.67) \\ &= 1 - P(Z \leq 0.67) = 1 - 0.749 = \underline{\underline{0.251}} \end{aligned}$$

Konstanten må oppfylle:

$$P(Y \geq k \mid \mu = 130) = 0.01$$

som kan omformes til

$$P\left(\frac{Y - 130}{1.5} \geq \frac{k - 130}{1.5} \mid \mu = 130\right) = 0.01$$

Konstanten er dermed gitt ved:

$$\Leftrightarrow \frac{k - 130}{1.5} = 2.325 \Leftrightarrow k = 130 + 1.5 \cdot 2.325 \approx \underline{\underline{133.5}}$$

c)

Sannsynlighetstetthetsfunksjonen er gitt ved:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4 | \lambda, t_1, t_2, t_3, t_4) = \frac{(\lambda t_1)^{x_1} e^{-\lambda t_1}}{x_1!} \cdot \frac{(\lambda t_2)^{x_2} e^{-\lambda t_2}}{x_2!} \cdot \frac{(\lambda t_3)^{x_3} e^{-\lambda t_3}}{x_3!} \cdot \frac{(\lambda t_4)^{x_4} e^{-\lambda t_4}}{x_4!}$$

Som gir følgende likelihood:

$$L(\lambda | x_1, x_2, x_3, x_4, t_1, t_2, t_3, t_4) = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^4 x_i} \cdot \prod_{i=1}^4 t_i^{x_i} \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^4 t_i}}{\prod_{i=1}^4 x_i!}$$

$$\Rightarrow \ln L(\lambda | x_1, x_2, x_3, x_4, t_1, t_2, t_3, t_4) = \ln \lambda \sum_{i=1}^4 x_i + \ln(\prod_{t=1}^4 t_i^{x_i}) - \lambda \sum_{i=1}^4 t_i - \ln(\prod_{i=1}^4 x_i!)$$

Deriverer og setter lik null:

$$\frac{\partial \ln L(\lambda | \dots)}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^4 x_i - \sum_{i=1}^4 t_i = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\sum_{i=1}^4 x_i}{\sum_{i=1}^4 t_i}$$

dvs. sannsynlighetsmaksimeringsestimatoren er:

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^4 X_i}{\sum_{i=1}^4 t_i} = \frac{\sum_{i=1}^4 X_i}{30}$$

Forventningsverdien til estimatoren er:

$$E[\hat{\lambda}] = \frac{1}{30} \{E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] + E[X_4]\} = \frac{1}{30} \{5\lambda + 5\lambda + 10\lambda + 10\lambda\} = \underline{\underline{\lambda}}$$

og variansen er:

$$\text{Var}[\hat{\lambda}] = \frac{1}{30^2} \{\text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + \text{Var}[X_3] + \text{Var}[X_4]\} = \frac{1}{30^2} \{5\lambda + 5\lambda + 10\lambda + 10\lambda\} = \underline{\underline{\frac{\lambda}{30}}}$$

d)

$Y = \sum_{i=1}^4 X_i$  er Poissonfordelt med parameter  $\lambda \sum_{i=1}^4 t_i = 30\lambda$  : Med  $\lambda \approx 0.5$  er  $\text{Var}[Y] \approx 15$   
 $\Rightarrow$  det er rimelig grunn til å tro at fordelingen til  $Y$  kan tilnærmes med en normalfordeling.

$$\hat{\lambda} = \frac{Y}{30} \approx n(v; \lambda, \sqrt{\frac{\lambda}{30}}) \Rightarrow \frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\frac{\lambda}{30}}} \approx n(z; 0, 1)$$

$$\frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\frac{\lambda}{30}}} \approx \frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{30}}}$$

Vi får:

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\hat{\lambda} - \lambda}{\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{30}}} < z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow P\left(\hat{\lambda} - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{30}} < \lambda < \hat{\lambda} + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{30}}\right) \approx 1 - \alpha$$

$$\alpha = 0.05, \quad \hat{\lambda} = \frac{20}{30} \quad \Rightarrow \quad \text{et 95 \% konfidensintervall blir:}$$

$$(0.67 - 1.97\sqrt{\frac{2}{90}}, 0.67 + 1.97\sqrt{\frac{2}{90}}) = \underline{\underline{(0.38, 0.96)}}$$

e)

$$\begin{aligned} P(T \leq t) &= 1 - P(T > t) = 1 - P(X = 0 \text{ i tidsrommet } [0, t]) \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & t > 0 \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases} \Rightarrow T \text{ er eksponensialfordelt.} \end{aligned}$$

La  $U = \min\{T_1, T_2, \dots, T_8\}$

$$\begin{aligned} P(U \leq u) &= 1 - P(T_1 > u, T_2 > u, \dots, T_8 > u) = 1 - \prod_{i=1}^8 P(T_i > u) \\ &= \begin{cases} 1 - \prod_{i=1}^8 e^{-\lambda u} & u > 0 \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-8\lambda u} & u > 0 \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-4u} & u > 0 \\ 0 & \text{ellers.} \end{cases} \end{aligned}$$

$$P(U \leq \frac{1}{4}) = 1 - e^{-1} = 1 - 0.368 = \underline{\underline{0.632}}$$

### Oppgave 3)

a)

$\mu$  = populasjonsjennomsnitt, dvs. et gjennomsnitt for alle bilane som kører på vegstrekningen i ein gitt periode.

$$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{12} X_i}{12}, \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{12} X_i}{12} = \frac{880}{12} = \underline{\underline{73.33}}, \quad S = \sqrt{\frac{1}{11} \sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2} = \sqrt{\frac{1034.7}{11}} = \underline{\underline{9.7}}$$

b)

Type 1 feil er å forkaste  $H_0$  når  $H_0$  er rett.

$$H_0 : \mu \geq 77 \quad H_1 : \mu < 77$$

$\alpha = 0.05$ , forkast om:

$$\frac{\bar{X} - 77}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < -t_{0.05, 11} = -1.8$$

$$\frac{\frac{73.33 - 77}{\frac{9.7}{\sqrt{12}}}}{-1.31} > -1.8$$

dvs. ikke grunnlag for å påstå at farten er blitt lågare på 5 % nivå.

c)

Type 2 feil er å ikke forkaste når  $H_0$  er gal. La  $\beta = P(\text{type 2 feil})$ . Då er styrken  $1 - \beta$ .

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\bar{X} - 77}{\frac{10}{\sqrt{12}}} < -1.645 \mid \mu = 74\right) &= P\left(\frac{\bar{X} - 74}{\frac{10}{\sqrt{12}}} < -1.645 + \frac{3}{\frac{10}{\sqrt{12}}} \mid \mu = 74\right) \\ &= \Phi\left(-1.645 + \frac{3\sqrt{12}}{10}\right) = \Phi(-0.61) \\ &= 1 - 0.729 = \underline{\underline{0.271}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\bar{X} - 77}{\frac{10}{\sqrt{n}}} < -1.645 \mid \mu = 74\right) &= 0.9 \\ \Leftrightarrow P\left(\frac{\bar{X} - 74}{\frac{10}{\sqrt{n}}} < -1.645 + \frac{3}{\frac{10}{\sqrt{n}}} \mid \mu = 74\right) &= 0.9 \\ \Leftrightarrow \Phi\left(-1.645 + \frac{3\sqrt{n}}{10}\right) &= 0.9 \\ \Leftrightarrow -1.645 + \frac{3\sqrt{n}}{10} &= 1.28 \\ \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{n}}{10} &= 1.28 + 1.645 = 2.925 \\ \Leftrightarrow n &= \frac{(2.925)^2 \cdot 10^2}{3^2} = 95.06 \end{aligned}$$

Dvs. vi må måle farten på 96 bilar eller fleir.